

**PSEUDOPLASMA
TA ATERO-
CHONDROMATOS
A MAMMARUM
UTERI ET...**

Pietro Borriero



Secretato

4. 7
32

PSEUDOPLASMATA
ATERO-CHONDROMATOSA
MAMMARUM UTERI
ET
GLANDULARUM LYMPHATICARUM
DISSERTATIO
INAUGURALIS
A
PETRO BORRIERO
EDITA



PATAVII
TYPIS SEMINARII
MDCCCXCV.



Intending:



Quoniam morborum et dissectionum historia, sapientissima viri sententia, canos medicinae progressus vel maxime promovere valet, cum vobis hac die, clarissimi Professores, aliquid proferre debeam, quod doctrinae medicae notionibus quocumque modo inseruire possit, nullam sane rem magis viribus aptam ac ligere potuissem, quam morbi singularis expositionem, quem observare mihi contigit. Si morborum conspectus multiplex medico quotidie exhibetur, si tot et tam diversa status animi, atque externi influant ad eum mutantum concurrent, ut diuturna doctrina et ingenti vis percussa raro ad quasdam perturbationes diagnoscendas sufficiant, profecto nil mirum erit, si morbum quem vobis expositorus accedo, doctissimis perquisitionibus sese abdere potuit. Tumores quatuor externae affectiones plerumque sunt, in tanta ambiguitate versantur, ut eorum distinctio peritissimas quoque vias definire nequeat. Et revera in clinico chirurgico, inspectante praestantissimo professore Signoroni, hujusmodi morbum anno praeterito examinavi.

Quaedam Angela G. a patre per matrem scirrhum percipio exorta, temperamento sanguineo irritabili, et praestanti corporis forma praedita, nulla dyscrasia laborare videbatur; levisima indicia characteris scrophulosi in ea solummodo adparebant. Catamena ad annum decimum secundum primis observant, quae regulariter inde et

copiose defluentis ponderis aequum et doloris ad mammas praesumebantur. Deinde illicita voluptatibus cum frequenter indulgeret, interdum concepit, et peperit. Extremo partu confecto, utero laboravit; probabiliter quod gestationi et puerperio non interviuit, aut inquam curam adhibuerit. Ceterum ea fuit valetudine, ut firmo corpore animumque attingeret aetatis annum quadragesimum tertium. Hic cum dexteram thoracis latus levis percuteretur, glandulas sub prolema axilla tumescere atque indurare, et altero post manus mammam quam haud secus committi. Per magna durities tumoribus inhaerebat, mobilitas, nullus dolor, quare cum nihil urgeret, mulier ut illa consulere, minime curavit.

Annum circiter ita res egit; sed cum a laboriosis officii fatigulae quiescere non daretur, post grave brachiorum exordium major in mammas tegumentis tumor et rubor apparuit, dolor quoque, et circulationis incitatio. Chirurgum adhibuit, et cum perussimum. Haec uberrima hirsutuum emissio, cataplasmata emollientia, mercurialiaunctiones diu in usum vocabantur. At sacra mali labe; nil aegras prodest. Mammam enim jam erysipelacea adeo tumet, ut ad papillam excoleatur. Quapropter cum nihil a methodo anaphlogistica utilitatis proficisceretur, somniam aliquam acrophulosum latere, atque in illum agendum esse opinabatur. Ulcus interim solutione crassati conspersum magis sese extendere; ejus adpectus deterior erat, linae superficies lardacea, margines crassi inaequales, et parva ichoris copia secreta. Ab aliquo tempore glandulae alterius axillas quoque induruerant, et inde etiam mamma sinistra. Hic vero corpus et vires cum segra in diem amitteret, atque animo vehementer angeretur, consultatio instituta fuit; et in eo sententiae conveniunt morbum cum obscurum, tum letalimum esse.

Quae cum ita essent, ad opem in nostro clinico exposcendam deferabatur. Aegram corpulentius corpore et viribus fere confectam, dolores, anxietaem in ore insidentes. Cutis arct, et calet vix majori gradu; pulsus frequentes, nonnulli vibrantes. Mamma dextera aliquo volumine adaucta exulcerata erat per dorsum et ultra convexitatis, ulcus notae jam relictæ superincumbebat textui duro fere lapideo, a quo cuncta mammae moles constituabatur. Pars cutis non adhuc exulcerata, magis crassa, rubra et dura cum venis circumambientibus varicosis. Dolores lancinantes a quocumque levi tactu exurgebant, haud raro spontanei. Glandulae subaxillares utriusque lateris tumentes et duras, nec non quaedam hinc lymphatica proxima. Mamma sinistra voluminis et tegumenti naturalis consistentiam admodum duram, et formam veluti ex glomeratis tuberculis constitutam, exhibebat. Catamenia jampridem in morbi incremento substiterant, reliquæ animales functiones sufficienti ordine peragebantur. Talis erat morbi conspectus.

Nos autem de morbi origine et decursu non satis edocti, cum tumorem glandularem ex systemate lymphatico prodeuntem viderimus, qui ex methodo antea adhibita, phlogistico processu committens fuisse videbatur, cum ulcus, quamvis antea fomentis irritantibus laessum, non admodum mali moris esset, et aegrae constitutio non illius indolis dispareret, quæ evolutioni scirrhomæ favere solet, credidimus lymphangiomam ab aliquo scriptulosa dyscrasie gradu suffultam organa glandula et vasa lymphatica majori ex parte confecta efficere, ac tali modo sese conducere potuisse. Ex eo igitur indicatio sequebatur, quod mercurialis, antimonialia, balnea ætheris resolventia expectari deberent. Die vigesima octavo Junii anni proxime elapsi, mole quamvis omnia, modica minuebatur. Aegra vix aliquot die-

huc haec remedia sufferre valuit, ventris adeo laborabat, ut quamlibet fere substantiam deglutendam respueret. Si alvus a biduo tactum consideret, molestissima erat; pyrosis; flatulentiam igitur retinere necesse erat. Lancinantes dolores tunc ad mammam dexteram, tunc ad flexum coarum superiorem, tunc ad ventrem vehementer ita audivant, ut, frequenti septentrum domi, ad eos leniendos opus esset. Sed via affulgebat quies, cito evanescentes, miserae nil melius erat. Ad vespas fere quotidie calor augmentum, et major in pectus incitatio, frequentes accessiones febriles venae sectionem cum emolumento ter expectae sunt. Aqua cohibata lauro-cerasi ad extremas usque dies expectata fuit; copiosissimus erat potus aquosus; ardens enim aëris urgebat. Mamma sinistra nullum progressum morbi ostendebat, cuilibet tamen resolvendum vi obstiterat. Conspicuum ulcus in dextera deterior in diem evaserat. Cetera quoque in pejus ruunt. Hlaec solventibus, mense circiter transacto, aliqua cancerosae vestigia ad papillam prodeunt, et cruor a fungosis excrescentiis quandoque manat. Conspersio cum pulvere myrrhae coactare non jam impedire cancerosae gressus valet; lente prosequitur. Crebriores febris exacerbationes, respiratio anxiosa, dolores suppressi, emaciatio horrida, collapsus praecox, omnia extremam horum portendunt. Decima Augusti die languori universali febris ardens cum delirio succedit, quae vi majori ad undecimam furens, quiescit in decima secunda, ut saltem tranquille miserrima conficeretur.

Necrotomia.

In mammam magis corruptam cultro primario ferebatur. Ulcus quod duas tertias hemisphaericii partes tenebat, ex parte crustis cancerosis tegebatur, ex parte excrescentias fungosas

perum prominentes exhibebat, et ex parte magis effusum canceracae erosiones ostendebat. Textus ulcerosus facile deleri poterat, et basis apparebat valde dura. Cuius quae non adhuc ulcerata erat, cum incidereetur, exteriori stratu aequo, cultro obstabat, et sub sectione peculiaris quidam rumor crepitans tradebatur. Dissecta in linea transversali media mamma ex homogenea materia dura, ac coactam esse patefaciebat. In quatuor deinde partes divisa, unaque ablata, conspeximus textum homogeneum albo-flavellum, inodorum, durum, elasticum, laevè acindendum, resistentem, consistentiae cartilaginiae mollior, qui nullum fusionis signum, nulla poris receptacula continebat; fortiter compressus pauca mucoſitate irrorabatur. Ceterae quoque mammae partes eadem ipsa substantia constitutae erant. Fibrae musculares subjectae nonnihil dealbatae et exiles adparuerunt. Ex eorum interstitiis corpuscula quaedam variae magnitudinis, a grano triticeo nempe ad amygdalam, effodiebantur, quae materiem mammae similem includebant; haec autem axillam versus copiosiora erant. Glandulae axillares utriusque lateris volumine aduuctae eodem substantia dura constabant. Mamma laeva tegumentis et volumine adhuc normalis erat; exterioribus cutis stratisque caesis, textus mammae dexterac statim esse exhibuit; hoc solummodo differabat quod aliqua in parte textus subcutaneus non tam cito indureſcebat; quare tumor utpote a variis tuberibus efformatus adparebat. Dissecta cranii cavitate tunicae sanguine suffusae adparuerunt, et substantia cerebrelli consistentiae mollior (cadaver a triginta horis jacebat in tempeſtate admodum calida). Patefacto thorace ter quatuorve seri unciae a dextera cavitate defluerunt, et pleura magis crassa costis anterieus valde adhaerebat; minus seri et cohaerentia in cavitate sinistra. Abdominis parietibus sublatis, nil vitiosi in

viscerum situs et forma rependebatur. Ventrículos leviem tantum ruborem ostendebat; nulla glandula aderat inspissata. Detracta autem vesica urinaria, uterus abdominis apparuit. Ubi ejus collum corpori connectitur infra tunicam propriam et peritonealem tumor siccis magnitudine offerebatur, qui consociatus texturam mammarum jam descriptam ostendit. Collum uteri valde crassum, et vaginae pars superior pari textura constabant. Cetera organa in normali statu reperta fuere. Frustulum hujus peculiaris substantiae in aqua per aliquot dies digestum, structuram non amisit; fluidum turbidum reddidit, quod gelatinae aliquid donavit. Cum autem ad distinguendas albuminam et fibrinam concretas quas principia bajuscemodi substantiae majori ex parte constituent, ipsi quoque Berachio certa characteres delicerent, ultiores chemicas inquisitiones praeterstrandis arbitrari sumus.

Nunc vero hujus morbi postquam historiam, per quod nobis est, diligenter exponere curavimus, liceat scholastico veluti tertamine ad hanc affectionem propius accedere, et quoniam ejus aspectus nunc patet, ejus indoles intimus perscrutetur.

Degenerationem organicam vaginae, uteri, glandulam lymphaticam et mammarum examinandum habemus. In mammis ubi morbus magis profundas radices delixerat, magis distant perquisitiones nostras.

Mamma dextera cutim rubentem tumentem intordum exhibuit; aderant quaedam phlogosae induriae, et methobus antiphlogistica adhibebatur. Perpendamus igitur si erysipelas tantum extiterit a quolibet irritatione productum, aut si passa contusione lenta phlogosis glandularis orta fuerit, quae exinde a causis externis, aut a fomite scrophuloso concitata ad altiorum gradum pervenerit, et ad cutim quoque sese diffundent. Prius quam

culis ruberet, tumesceret, interna affectio jam-
 dudum perduraret, quin ulla inflammationis indicia
 prodicerent; et mastitis quaelibet non est mortuus
 qui ita latens decurrere solet. Erysipelas adpe-
 ruit cum mammae volumen admodum magnum
 erat; in mamma sinistra quod tumor non adeo
 extendebatur, nulla cutanea phlogosis viguit. Ex
 mechanica distensione atque externis irritantibus
 cutis inflammatio exorta videtur. Sed concedatur
 mastitem cujuscumque indolis et decursus extinctam;
 productum quod parere potuisset, observetur.
 Processus inflammatorius diu in quodam organo
 persistens, ejus conditiones dynamicas et mate-
 riales turbare potest; interdum augeat, interdum
 destruit ejus substantiam. Inter exitus inflama-
 tionis quibus massa organica augeatur et dissipetur,
 habentur crassitudo et induramentum.

Consistit crassitudo in materiali augmento ali-
 cujus organi aut uniformi, aut in aliqua parte ma-
 jori, quod ex luxuria vegetationis hinc textibus
 propria procedit. Induramentum efficitur quoties-
 eumque principia quaedam heterogenea infra or-
 gani inflammati parenchyma acceduntur. Haec
 nova principia volumen et consistentiam, minime
 autem pristinam texturam mutare valent; nisi me-
 chanice vi agere possunt, et si textus proximae
 interdum corrumpunt, hoc fit, quod veluti cor-
 pora extranea, processum aliquem pervertentem
 excitant. Si materiae secreta in loco deponitur,
 ubi sua quantitate massam per se constituat, haec
 inertis jacebit, non amplius augebitur, quod defi-
 cit auae causa productionis, et intima vita desti-
 tutur; aut consistentiae sit majoris, absorbentium
 vi deletur. Et si dissolutioni ac putredini obstat,
 hoc est quod in sphaera conditionis vitalis repe-
 ritur. Aliquem organisationis gradum interdum
 assumit a contiguis partibus, quarum propages
 vegetativae tunc constantur. Naequam igitur in-
 flammationis via in crassitudine et induramento

pristinam organorum compositionem omnino even-
tore valet. Pars textus qui in supra nostra mole
adducti inspicant, in substantiam novam primi-
genia conditione, omnino diversam converti so-
runt, ex processu tantum phlogastico metamor-
phicam hanc non sive dicere. Sed quispiam re-
feret, non hoc tantum inflammationis exitus esse,
qui organicam conditionem mutare possint. Hoc
quidem; et nos discrimen aliquod inter varias in-
flammationis exitus hic statuendum esse arbitra-
mur. Quotiescumque inflammatio non plane re-
solvetur, texturam organicam turbavit, et mate-
riam educta producta. Ex hisce, aliqua exoriantur
et in processu inflammationis complectuntur, et haec
producta exitus inflammationis haberi merentur:
et aliqua in processu inflammationis causam tan-
tummodo evolutionis acquirunt, et effectus in-
flammationis non producta recensenda sunt. In-
flammati nimirum suo decursu conditionem or-
ganicam turbare potest; ex hac turbatione nova
exoritur conditio, quae extincta etiam inflamma-
tione, producta propria gignere valet. Huiusmodi
producta cum inflammatione non conficiuntur,
quae etiam absque ejus influxu interdum evolvi
possint, cumque exorta organisationem et vim pe-
culiarem absque inflammationis concursu acqui-
rant, ab inflammationis exitu jure meritoque se-
cernenda sunt. Processus vegetationis perturba-
tus est conditio ad haec producta necessaria. Si
materies novae productionis partibus affinis sit, in
quibus ingeneratur, si eandem sequatur leges to-
tidem excrescentias, totidem propagines ipsarum
partium constituit; si contra vicem indelem nova
producta, et formam acquirant, ut organa he-
terogeneae conditionis et structurae evadant, pe-
culiarem ordinem constituunt, pseudoplasma vocantur.

Quoniam organica metastasis, quam nos explo-
rare studemus, non tantum ex inflammatione ge-

nita videtur, indelem pseudoplasmatum observabimus, ut illis si referri possit, inopescent. Inclinus processus pseudoplasmata efficiens, quamvis curvitasem selectissimorum virorum aspiantur torserit, adhuc latet ut ceteri generationis processus. Si physiologia non adhuc eo pervenit, ut in normali statu producta oeconomiae animalis dignoscatur, si processus assimilationum, secretionum normales abditu adhuc latent, si via procreatrix naturae etiam ordinata incomprehensibilis sit, quomodo pathologiam illam aberrantem assequi poterit? Actionem igitur intimam causarum, nec non intimos processus, quibus pseudoplasmata progignantur praeterendo, illas condiciones, quae ad eorum evolutionem influxum exercere possunt, et perturbaciones organismi patentes, quae antecedunt, comitantur et consequuntur, breviter perpendere curabimus.

Ut pseudoplasmata germinant, opus est ut vis nuticiens produgens perturbata sit. Haec vis residet in organa, fluida nutritioni inservientia secermentibus, et ipsa fluida vitur. Turbabitur igitur quoscunque organorum actio, et quantitas ac qualitas fluidorum turbatae sunt. Actio organorum omnium eodem tempore perversa, dispendere nequit, productum vitale nullum edere valet, organismum cissime dissolveret. Unius autem aut plurium organorum actio quidem turbari potest, et ex mutatione dynamica, et ex mutatione materiali. Vis in organa sanae constitutionis aut augetur, aut immutatur. Compositio organica exstitit cum aequilibrium molecularum constitutum et conditio mutantur, hoc autem per vim inhaerentem, et per fluida nutientia. Igitur perturbatio dynamica et materialia aejunctae diu persistere nequeunt. Fluida nutientia, quae organa ea secermentia turbentur, primitus nunquam variari possunt, interdum vero sana quamvis ex origine profuant, quibundam forticia influxibus

subiciantur, quibus inquinata organa cum inser-
vere debent causa perturbationalis evadunt. Actio
igitur organorum eversa momentum praecipuum
ad pseudoplasmatum genesin sistit; quaecumque
causa hanc actionem aberrantem redderet, pseu-
doplasmata quoque excitare posset. Sed quoties
organorum incitamentum et compages non per-
turbaretur, quin spurcae vegetationes exoriantur?
Nequebant quoque pseudoplasmata ad eorum evo-
lutionem dispositionem quandam, aliquam pecu-
liarem conditionem cuilibet organo inhaerentem,
quae omnia veluti generationis factores perpetuo
lacebant.

Quae cum haec sint, perspecta hujus morborum
ordinis natura, priusquam nostram quoque ad
eodem morbos referamus, auctores qui de hu-
jusmodi affectionibus pertractarunt consulendos
esse credimus, ut, cogitans eorum opinionibus,
conveniendum sit nec ne, morbum in aegra no-
stra repertum, pseudoplasma retinere. Tumor
quicumque frigidus, indolens qui absque causa
manifesta exoritur durus admodum extiteret, scir-
rhus olim vocabatur, et caner quolibet mali
morbi coelestatio. Praemagnum igitur morborum
copiam veteres tali nomine designabant. Itaque
ex eorum scriptis quavis degeneratio orga-
nicae frequenter prodesset, quae similitudinem no-
bis observatae exhiberent, atque ex tanta do-
ctrinae et denominationis coarctatione, nullae re-
ctae notiones elci possunt. Recensiores de scir-
rho scriptores omni studium ad id impenderunt,
ut scirrhī natura elucisceret, et a propinquis af-
fectionibus diagnosticetur; sed tot et variae opi-
niones in ipis quoque concurrunt, ut nondum
scirrhī characteres adeo praefiniti sint, quod in
omni studio ac specie certa sit diagnosi. Et re-
vera sapientissimorum virorum sententiae de scir-
rho generi, sede, aspectu, et specificis virtutibus
quomodo inter se non discrepant? Hippocrates

veteresque aliî temperamentum melancholicum scir-
rhi evolutioni favere retulerunt. Sabatier et pler-
que recentiores magis hoc in temperamento san-
guineo inferiori experti sunt. Aliqui scirrhum in
adultis tantummodo evolutum voluit, nonnulli in
qualibet ætate. Adant qui morbum hereditarium,
qui contagiosum, qui universalem, qui localem scir-
rhum existimant. Quidam e recentioribus quoque
scriptoribus a generali functionum assimilationum
perturbatione, a peculiari diathesi conditione
tale productum exoriri opinantur, quod humorum
massa exsuda, decedens, petat organon aliquod in
quo coactum scirrhus evadat. Ex eo manet opi-
nio, quod ubique scirrhus evolvat, adspexitum,
materiem semper eandem exhibeat, quod non
ex organica conditione individuali, sed quadam
causa communi effici debet. Præterea, quod ali-
cujus visceris pars, adhuc integra a materie scir-
rhosa interdum sepistur; quod plures scirrhî con-
temporanei consurgant; quod adant scirrhî cum
doloribus aut quacunque sorta corpus extructur-
tur. His oppositur illorum sententia, qui obiter-
runt generalem assimilationis functionem per-
versam stare non posse, minimeque producta
diu vegetantia gignere atque alere. In majori ha-
rum functionum perturbatione, ut in stadio ex-
tremo scorbuti, syphilidis ec. plurima systemata
affici, et generalem dissolutionem properare; scir-
rhum contra in quibusdam tantum textibus unum,
et diu innocuum frequentissime occurrere. Si
conspicimus, si eadem materies a scirrho semper
exhibentur, nome processu semper eodem in
quolibet organo produci possunt? conditio orga-
nis inherens peculiaris semper eadem producta
semper eadem cur gignent non valebit, quin ma-
terialis metastasis in ipsis eveniat? Si pars aliqua
visceris adhuc incolatus a scirrho circumscripta sit,
non ideo inferendum erit, quod materies scirrhosa
a sanguine secreta, et illic effusa partem viscera

obsolescit. Reliquae rursus partes non simpliciter aduunt, in propriam ergo substantiam a scirrho conuertere sunt; et hæc quoque quæ adhuc incorrupta reperiuntur, progressu temporis conuertere possent, et scirrhos in ita faceret, ut ejus evolutio impediretur, necesse erit. Quæ rectius in tali casu cogitant illi, qui scirrhum ex pluribus locis evolutum existimant, ex illis scilicet partibus, quæ ad eum evolvendum dispositionem et causas habebant, atque ab eo comprehensam esse partem, quæ conditionem quandam haberet, causas evolutiōis non adhuc ut perpetuas. Origo autem alicujus scirrhī quæ dolorem et rixas nullo afferat, magis e locali quam universali morbo proficisci videtur. Quos cystici tumores ita non germinantur, quoties systema crystallinum non ita permittitur? Si plures scirrhos eodem tempore adhaeret etiam conceditur, cum eorum evolutio ita tacita sit, quidnam de eorum ortu contemporaneo aut progressivo, præsertim si intime locant, certiores nos reddere valet? Quotiescumque scirrhos causas inflammationem perturbantes sequatur, nobis ostendit, quod in ea perturbatione causam determinantem acquirit, non jam essentialē conditionem. Status ille generalis, a quo in humorum crassi scirrhos generatur, diarrhoea scirrhosa vocatur, et hæc sive stabilis, sive temporaria, prout continuo perdurat, aut cum sese a præteritis elementis expurgaverit, aliquando desinit. Nonnulli etiam clariorem viam scirrhū veluti criticum productum eidem organo commisso scindere vident, quod ita locatum influxum faventem veluti semen expectat, ut evolvi possit. Hi quævis diarrhoeam scirrhosam adscribere nequeant, in illos conveniunt qui temporariam concedunt; neque vident influxum seminis evolutiōi necessariam sufficere posse in organo ad scirrhū disposito, ad scyrrum evolvendum, quin semen lateat.

Itaque mens illorum rem clarius speculari videtur, qui scirrhum lesionem organicam (1), texturam degenerationem ab eorum via nutritionis vitiis (2), morbum organorum conditioni inherentem (3) adjudicant. Quaelibet sane pars in sua oeconomia perturbata statum vegetantem adeo aberrantem habere potest, ut ejus indoles omnino evectatur, ut pseudoplasma efformetur. Quare et glandula mucosa et cellula pinguedinosa in tumorem cysticum et fungum degenerare possunt, in scirrhum, glandula conglomerata.

Sedem quam scirrhus invadere potest, non in minori opiniorum diacrimine, quam ejus generis versatur. Glandulas conglomeratas et cutim scirrho tantum nonnulli concedunt; aliqui glandulas quoque lymphaticas et textum cellularem. Sunt denum qui scirrho cunctis textibus grassari contendunt. Etiam aspectus diversimode exhibetur: est tumor valde durus, frigidus, nodosus, insensibilis, insolubilis, unus, non admodum magnus—est tumor durus aequalis, resolvable, melius interdum et elasticus. Quapropter multi characteres, quibus aliqui sedem et formam scirrhii certam designare credunt, ab aliis omnino refelluntur; pari modo ejus decursus, exitus et peculiaria qualitates inferantur. Scirrhus lente crescit, innoxius diu jacet; si aliquid ejus evolutioni favent, cito interiora emolluntur, exulcerantur; ceteroquin lente quidem, sed ad eundem exitum necessario pervenit. — Scirrhus tantum mechanice laedere valet, lentissime progreditur, in cancerum raro abit, aegra longam admodum vitam ducere possunt. — Scirrhus sanctus excisus antequam dolens et mollis eveniat, amplius non redit. — Scirrhus qualibet stadio excisus acrior resurgit. Cancer legitima scirrhii sequela; nullus alius tumor quamvis lacteus, cancerum edere potest. —

(1) Flad. (2) Richard (3) Carlin.

Et quocumque tumore cancer prodire potest; absque praevisa induratione interdum exoritur, ab eo contra scirrhus promoveri potest. Hae ceteraeque aliae contrariae opiniones ostendunt, quantum absimus a certa scirrhii notione; sed quomodo hoc vni doctrina clarissimi tali pacto discreparent, nisi scirrhus natura et forma cum aliis morbis facillime confundi posset? Fungi et scirrhii tanta cognatione in quibusdam speciebus notantur, ut aegre interdum diagnoses queant. Ea vero Gallorum scripta percurrendo fungosae et scirrhusae affectiones ita copulatae et confusae reperiuntur, ut nullum essenziale discrimen in ipsa adpareat, immo in se invicem permutari videantur; praesertim cum in eodem tumore scirrhii substantia propria, et fungi conpuncta fuisse referatur. Anghi contra medici scirrhos et fungos omnino diversos existimant; sed in eorum paene infinita fungorum expositione quaedam species, et quaedam eorum stadia adparent, quae scirrhii characteres et canceri ita praeseferunt, ut ab his et diagnoses difficillimum sit. Omnes fungorum species et formas, quae veluti colores fere innumeras sunt, nec non scirrhorum exponere opus esset, ut differentia inter eos si quae sit ostenderetur; sed cum tantum erus nemini adhuc suscipiendum sit, nobis sufficiet si utriusque morbi gradum cognationis exponere, et inde juxta decursum eorum magis communem, characteres qui frequentius animadvertuntur referre valebimus. Fungi omnes et scirrhii ab abnormali vi nutritionis procedunt. Sunt pseudoplasmae quae in organismis vegetant, et cum eo necum et relationem juxta sedem et evolutionem exercent. Eorum vita organismi vitae intima; nunquam processu proprio sese condere valet, nisi prius vitam generalem integerit. Omnes a massa communis nutrimentum hauriunt, et peculiaris elementa intus percuti; veluti producta animalia

simplicissima, facili modo reproduci possunt; quolibet eorum molecula veluti radix germinare potest. Hisce partibus utraque propria conditio- nibus, cujuscunque generis originem, decorum et exitum ut frequenter adpareat, observemus.

Scirrhus in aetate critica, in individuis tempe- ramenti sanguineo-biliosi, fibras rigidas plerum- que evolvitur. Glandulae lymphaticae cutem ex- ternam et internam aggrediuntur; causas inflama- tionem vehementem minime excitantes, sed exi- guam diuturnam iritationem exercentes conse- quuntur; interdum absque causa manifestis adpa- ret, saepeasque absque dolore. In tria stadia di- stinguitur: cruditas, coctio, exulceratio. In primo est tumor valde durus, inequalis, non admodum magnus, mobilis, indolens, calore et tegumentis normalia, materie compositus alba consistentiae cartilaginea emollitur, a stris qui- busdam fibrosis albisimis distincta, quae ad cir- cumferentiam a centro vergunt, compressione hu- mor albamineus densus elicitur. In secundo, quo stadio canceri latentis quoque nomine inogra- tur, tumor est magis tuberosus, cutem hanc illic magis excolit, eidem adhaeret, non nihil contra- hitur, fisiones internas et ulcera non raro con- tinet, dolores lancinantes eda. Glandulae lym- phaticae proximae adsunt haud raro tumentes et durae. In tertio stadio cancer patet, vehementer dolet; ulcus mali moris dura finitur basi, de- pauperenti hiatu progreditur, excrescentias duras inequales, margines irregulares avertos exhibet, ichor edens livialis serrenitur, cruor raro ma- nat. Interim scirchi ex aliis quoque organis pro- deunt; universa inficiuntur, collabuntur. Scirrhus in primo stadio si radicitus avellatur, rursus- que redi, si vero reproductus frequenter videat- ur, hoc erit quod omnes ejus radices non cul- tro effugias fuerint; aut quod in aliis etiam or- ganis conditioibus ad scirrhum pervenientibus,

causas ubiorem, alio scirrho, alteram agili evolutionem excitant. Si diathesis scirrhusa morbosam lentem secernens adesset, scirrhorum extirpatio in primo stadio magis frustranea evaderet, quod diathesis tunc scirrhuso elemento magis calore recensendum est. Scirchi extirpatione bis terve repetita, et tandem deleti, novarum opinionum confirmant. In secundo stadio extirpatio utilis rarius experta fuit; immo aliqui forte nocuendi tentantur. Sed chirurgi omni fide dignissimi caneros occultos excidisse profitentur, et nosmetipsi in chirurgica schola ab eodem peritissimo Directore tres caneros occultos omni ex nota, cultro sanatos conspeximus. Diebus nuperime transactis ipse alterum scirrhum in secundo jam stadio versantem evulsi, quo dissecto cavitas tres ichoris nigricantis uncias circiter includens patefacta fuit. Vulnus bene procedit, tempori iudicium utilitatis committitur. In superioribus tribus scirchis non alias reproductis, hoc contingit observandum, quod fusiones et alia, ut in hoc quoque notissimo, a parietibus crassis et duris sepebantur. Hoc quidem magni momenti ad conveniendam operationis dijudicandam, repetitas et accuratas animadvertentes meretur. Huiusmodi observatio illorum opinioni favere videtur, qui secundariam scirchi evolutionem magis quam a consensuali dynamico processu, a materiali diffusionem exortam credunt.

Si Walter scirrhos magnas cavitates includentes difficiliter quam duros firmos reproduci contendit, aut illos cavitates duris parietibus circumscriptas fuerint, aut probabilius pro scirchis atramentis assessor observarent. Cancer patens nulla vi coluberi potest: terribilissimus in exitum ruit.

Fungi in qualibet aetate, frequentius in juvenili exurgunt, individuos cachecticos fibrae molliora peraepe afficiunt, et in textu cellulari substituto atque intermusculari majore frequentia

evolvuntur. In eorum cruditata duritiem plura minusve elasticam, et progressu temporis etiam fluctuantem exhibent. Substantia fungos plerosque constitutiva cerebriformis est, et vasa sanguinea nunc caret, nunc scatur. Perturbationes systematis sanguinei fungorum ortum non raro antecedunt, frequenter comitantur et sequuntur. Ex his permagnam evolutionis causam et magis diffusam organa ad fungos disposita acquirere possunt. Itaque fungi plures quoque eodem tempore germinant, et facillime reproducuntur. Varias dyacrasias herpeticas, scorbuticas etc. cum huiusmodi perturbationes efficere valeant, fungorum evolutioni favere possunt; hinc fungosos tumores quidam scirrhos existimans, caneros herpeticos, scorbuticos, syphiliticos retulit. Eadem stadia quae scirrhus fungi percurrunt, non autem pari modo. Stadia cruditatis et maturationis pro varia fungorum specie diversimode exhibentur. Extremum exulcerationis facilius cum cancro confundi potest; haec tamen carcinomata plerumque non adeo est dura, excrecentias molliores et magis crassas habet; ichor quod accernitur non leucivialis olet. Præter influxus quos exercent fungi ab eorum indole, sede et evolutionis gradu vel maxime pendens.

Hi præcipui sunt characteres qui in communiori fungorum adpectu proficiuntur; sed cum eorum species a minimo consistentias gradu ad causam usque duritiem pervenire possint, cumque intima structura tam multiplex tamque varia appareat, conficiendum est aliquas fungorum species earumque stadia existere, quæ necdum a scirrho recte distingui possunt.

Difficultas sane augetur quod scirrhorum et fungorum species ultra transferre, et nimium extendere conatur. Hisce omnibus characteribus utriusque morbi relatis, discrimen hoc frequentius excutitur, quod aliqua individualis constitutionis *discrepancia* intercedere videtur.

Diuturna historia quae seriem copiosam harum affectionum ita referret, ut exactissime status individualis, et omnia morbi symptomata et effectus exponerentur, lumen aliquod diffunderet.

Reliquum est, ut morbus, quem examinandum suscepimus, in aliquo harum affectionum ordine, si fieri potest, definatur. Characteres scirrhi et fungorum generales cum patet committere; et quidem hanc similes fuisse affectiones illas iudicandum est, quae scirrhos et fungos ita in dubium retulerunt. Hic tamen a communi scirrhi decursum in eo decedit, quod in glandulis lymphaticis exortus sit, quod plures partes eodem tempore affecerit, quod magnum volumen adeptus fuerit, et quod in suis tumoribus, ne in illo quidem mammae dexterae exaceratae, nullae essent fusiones nulla substantiae varietas. Si ab utero morbum processisse volumus, in eo non formam scirrhi magis propriam deteximus, sed magis corporum fibrosorum. Frequentioribus fungi speciebus quoque distat, symptomatibus enim magis communibus haud comitabatur; nihilominus fungo atrochondromatoso aequiparari posset.

Nos vero certioribus notis fungus et scirrhus usque dum distingui nequeant, neutri referre audebimus, et morbum interim generali nomine, pseudoplasma, et specifice ex peculiari ejus substantia atrochondromatosum vocabimus.

THÈSES DEFENDENDÆ

I.

Medicus diagnoscat causas humanam economiam lædentes, quas perturbationes perpendat, intus ingredi caveat.

II.

Indicata sacci lacrimalis apertura, quo citius fit, eo magis expedita fistulae curatio.

III.

Vox e glottide, ut sibilus e labiis.

IV.

Morbos chronicos magis quam acutos remediis urgere opus est.

V.

Major est morborum chronicorum numerus, quod impetu acutorum represso, reliquis eorum securus negligitur.

VI.

Oculi majori nexu quam cetera organa cum organismo junguntur.

VII.

Nervorum mobilitas frequens inflammationis momentum.

VIII.

Aqua cohibeta lauro-cerasi in primo stadio praesertim et extremo inflammationis pericope utilisima.

IX.

Una phthisis pulmonum, tubercularis.

X.

Morbi locales majorem plerumque influxum in
statum universalem exercent, quam status univer-
salis in illos.

XI.

Animi pathemata semper excitantia.

XII.

Līnea obscurior, quae quindecim circiter dies
post partum a scrobiculo cordis ad umbilicum vel
pubem descendit, criterium aliquod partus re-
centis.

X

1

1